

PRZED ZABIEGIEM

- Pacjent powinien ogolić miejsce zabiegu – okolicę krocza – najlepiej kilka dni przed operacją.
- W dniu zabiegu proszę pozostać na czczo. Dopuszczalne jest przyjęcie leków zgodnie z zaleceniami lekarskimi i popicie ich niewielką ilością czystej niegazowanej wody.

PO ZABIEGU

- Pacjent po biopsji stercza powinien zapewnić sobie towarzystwo opiekuna, który po wyjściu z placówki bezpiecznie odwiezie go do domu, gdyż zabronione jest prowadzenie pojazdów mechanicznych do momentu ustania działania środka znieczulającego.
- Przez kilka dni po zabiegu możliwe jest okresowe pojawianie się krwi w moczu i/lub stolcu.
- Może pojawić się krew w nasieniu w trakcie pierwszej ejakulacji po zabiegu.
- W przypadku stałego krwawienia z dróg moczowych/ odbytu lub utrzymującej się temperatur ciała powyżej 38 stopni Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do Szpitala.

ZALECENIA

W okresie pozabiegowym przez okres 2 tygodni należy:

- unikać zimna
- unikać intensywnego wysiłku fizycznego
- unikać gorących kąpieli – wskazane korzystanie z prysznica
- nie spożywać alkoholu
- przyjmować leki zgodnie z zaleceniem lekarza